

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HorticAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

## Midemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved anvendelse i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår
- Ved anvendelse i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand og bier må der max udflyttes 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af pryddplanter og planteskolekulturer. Udflytning må tidligst foretages 7 dag efter sprøjtning

Advarsel: ”Se Floramite 240 SC etiketten”.

## Brugsanvisning

### Anvendelse: Til bekæmpelse af spindemider i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthusareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til <b>containerplads</b> med eller uden recirkulering.
Pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på tætte borde</b> med recirkulation.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,6 L Floramite 240 SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning.	<b>Uden recirkulering:</b> 7 dage.
				<b>Med recirkulering:</b> 7 dage.
Pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på jorden</b> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,04 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,6 L Floramite 240 SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet bifenazate.	<b>Uden recirkulering:</b> 7 dage.
				<b>Med recirkulering:</b> 7 dage.

\*0,04 % opløsning (= 40 ml Floramite 240 SC i 100 L vand)

*Sprøjteudstyr:* Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen.

*Forebyggelse af resistens:*

Hvis Floramite 240 SC anvendes mere end én gang skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Nissorun 250 SC) for at forebygge resistens. Tjek altid godkendelsesstatus og følg brugsanvisningen for andre midler.

*Risiko for skade:*

Da der er begrænset erfaring med Floramite 240 SC, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

21. december 2020