

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Geoxe 50 WG (1-227) mod Fusarium i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Geoxe 50 WG (1-227) mod Fusarium i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af Fusarium i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved håndtering af planteskolekulturer og pryddplanter i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Arbejde med pryddplanter og planteskolekulturer i væksthuse må først finde sted 10 dage efter sprøjtning
- Anvendelsen skal foregå på tætte borde med recirkulation eller på tæt bund med opsamling/recirkulation
- For at beskytte grundvand: Max. 1 behandling med fludioxonil pr. væksthuseareal pr. år
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: Max 1 udflyttet hold behandlet med fludioxonil pr. areal pr. år
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

Advarsel:

”Se Geoxe 50 WG etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod Fusarium i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering
Pryddplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt bund med opsamling/recirkulation.	0,5 kg/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,05 % opløsning pr. 1000 m ²	Max 1	Max 1	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet hold pr. areal pr. år behandlet med fludioxonil.
				Med recirkulering: 1 dag.

*0,05 % opløsning (= 50 g Geoxe 50 WG i 100 L vand)

Sprøjteudstyr: Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Geoxe 50 WG i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.