

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Gnatrol SC (526-14) mod larver af sørgemyg i frøafgrøder i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Gnatrol SC (526-14) mod larver af sørgemyg i frøafgrøder i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod larver af sørgemyg i frøafgrøder i åbne og lukkede væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes

Advarsel:

”Se Gnatrol SC etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i åbne og lukkede væksthuse

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Vandmængde	Behandlings-tidspunkt
Frøafgrøder (afgrøder til frøproduktion)	Larver af sørgemyg	5-10* ml/m ²	Max. 3 (interval 5-7 dage)	500-2000 L/ha	Ved behov

* Laveste dosering kan anvendes mod mindre populationer af små larver i de tidligere larvestadier, samt hvis det er et led i et integreret behandlingssystem med andre metoder.

Der sættes ingen begrænsning på max. antal behandlede hold frøafgrøder på samme areal pr. år.

Sprøjteteknik/udstyr: Bomsprøjte eller håndholdt sprøjte/kærresprøjte med lanse. Udsprøjtes eller udvandes på bede/borde.

Temperaturen bør være over 15 °C.

Risiko for skade: Skade på kulturplanter er ikke sandsynlig.

Dato: 7. juni 2022