

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Goltix 70 WG (396-69) mod ukrudt i planteskolekulturer og pryddplanter på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Goltix 70 WG (396-69) mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland

## Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.
- Hvis midlet anvendes i frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes.
- Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.
- Må ikke anvendes senere end den 15. august.
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder.

## Advarsel:

”Se Goltix 70 WG etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

### Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger og behandlingstidspunkt

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt
Planteskolekulturer og prydplanter på friland	Frøkrudt herunder vanskeligt bekæmpelige arter som burrester, enårig rapgræs, liden nælde, raps, sort natskygge og snerlepileurt	Max 1 kg pr. ha pr. behandling. <b>Totalt max 3,0 kg pr. areal.</b> <b>Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.</b>	200 L/ha	Max 3 behandlinger (mindst 7 dages interval)	Som jordmiddel før ukrudtets fremspiring i foråret eller på ukrudtets kimbladstadiet (BBCH 10-18).  Må ikke anvendes senere end den 15. august

*Sprøjteteknik/udstyr:* Behandlingen skal enten udbringes på bar jord, udføres på planter i vinterhvile (før knopskydning) eller som afskærmet sprøjtning.

Anvendes mod frøkrudt herunder vanskeligt bekæmpelige arter som burrester, enårig rapgræs, liden nælde, raps, sort natskygge og snerlepileurt.

Dato: 21. januar 2020