

Godkendelse af MaisTer til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i hyben

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Vejledning for MaisTer i hyben

Virkemåde:

MaisTer er et systemisk middel, der primært optages gennem bladene. Begge aktivstoffer tilhører gruppen af sulfonylureamidler, og virker ved at blokere aminosyresyntesen. Efter 10-15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, og visner væk i løbet af de næste 2-4 uger.

Advarsel:

Den godkendte brugsanvisningen til mindre anvendelser skal følges. Godkendelse/vejledning til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet. Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af MaisTer i hyben

Anvendelsesområde:

MaisTer anvendes i hyben til bekæmpelse af ukrudt. Midlet kan bekæmpe en række tokimbladede og enkimbladede ukrudtsarter (se etiketten).

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

MaisTer udsprøjtes om foråret når ukrudtet har 2-3 løvblade.

Etableringsårene: MaisTer anvendes uden afskærmning før knopbrydning.

Høstårene: MaisTer anvendes med fuld afskærmning før knopbrydning og senest 3 måneder før høst.

Der skal være en afstand på mindst 10 m til vandmiljøet (søer, vandløb m.m.).

Optimale virkningsforhold:

MaisTer udsprøjtes når, der er vækst i ukrudtet, og temperaturen er over 8° C.

MaisTer er regnfast efter 2 timers tørvejr.

Der bør ikke behandles med udsigt til nattefrost.

Dosering:

Der må max. anvendes 150 g/ha MaisTer pr. sæson. For at sikre en optimal optagelse og effekt skal der tilsættes 0,67 l MaisOil pr. 50 g MaisTer.

MaisTer kan udsprøjtes af en gang eller ved en splitbehandling, hvor ca. 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes når ukrudtet står med 2 - 3 blade, efterfulgt af den resterende dosering 10 - 14 dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse, samt hvor der erfaringsmæssigt er risiko for nyfremspiring.

Der anvendes normalt 150-200 l vand/ha.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale anvendelsen af MaisTer i hyben efter ovenstående brugsanvisning.

Juli 2011