

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Met52 Granular mod Trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Novozymes kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder Met52 Granular må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Met52 Granulars effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Met52 Granular mod Trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer

Met52 Granular middel:

- Må kun anvendes i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer til behandling af Trips

Advarsel:

"Se Met52 Granular etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Met52 Granular mod Trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer

Skadegører:

Trips

Dosering:

Met52 Granular	0,5 kg pr m ³ vækstmedie, iblandet før potning/plantning
----------------	---

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Met52 granular skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet, og at vækstmediet herefter anvendes inden 30 dage.

Met52 granular virker mod alle trips larvestadier.

For at opnå god kontrol med trips larver i små potter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større potter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Larverne i den oprindelige jordknold kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Antal behandlinger

Behandlingsfristen for jordbær (væksthus og friland), hindbær og brombær:

Max 2 behandlinger pr. sæson.

Behandlingsfristen for solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær:

Max 3 behandlinger pr. sæson.

26. september 2013