

**Brugsanvisning til mindre anvendelse af
nedenstående metamitronholdige midler
mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær**

**Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), ATR Metamitron (826-1),
ECP Metafol SC (594-21), ECP Metafol 700 (501-30),
Metafol 700 SC (14-258), Metafol 700 (501-42),
Skater (396-52),
SweDane Metafol 700 SC (14-252), SweDane Metafol 700 (501-41),
Target SC (594-17) og Target 700 (501-27)**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for anvendelse af de metamitronholdige midler Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), ECP Metafol SC (594-21), Metafol 700 SC (14-258), Metafol 700 (501-42), Skater (396-52), SweDane Metafol 700 SC (14-252), SweDane Metafol 700 (501-41), Target SC (594-17) og Target 700 (501-27) mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær

Ukrudtsmiddel:

- Anvendes mod frøukrudt til at bekæmpe vanskelige arter som burrenerre, enårig rapgræs, liden nælde, raps, sort natskygge, hanekro og snerlepileurt
- Må ikke anvendes senere end de sprøjtefrister for de forskellige afgrøder som er angivet i nedenstående tabel og aldrig senere end den 15. august
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
- Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal

Advarsel:

"Læs midlernes etiketter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Metafol 700 SC (14-252) og ECP Metafol SC (594-21) har opbevarings- og anvendelsesforbud den 1. januar 2018, SweDane Metafol 700 SC (14-252) den 2. februar 2018 og Target SC (594-17) den 6. januar 2018.

Brugsanvisning for anvendelse af de metamitronholdige midler Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol SC (594-21), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 SC (14-258), Metafol 700 (501-42), Skater (396-52), SweDane Metafol 700 SC (14-252), SweDane Metafol 700 (501-41), Target SC (594-17) og Target 700 (501-27) mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær

Dosering, skadevolder, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist

| Afgrøder | Skadevolder | Max dosering pr. sprøjtning og max dosering i alt | Max antal behandlinger | Sprøjtetidspunkt | Sprøjtefrist (PHI) |
|--------------------------------|-------------|--|------------------------|---|------------------------------|
| Gulerod, persillerod, pastinak | Frøukrudt | 2,0 l/ha før fremspiring 0,5 l/ha efter fremspiring I alt max 2,0 l/ha | 4 | Senest på afgrødens 3 blad stadie På småt ukrudt | 2 måneder |
| Rødbede | Frøukrudt | 1,0 l/ha pr. sprøjtning I alt max 3,0 l/ha | 3 | På småt ukrudt | 105 dage |
| Jordbær | Frøukrudt | 0,5-1,0 l/ha pr. sprøjtning I alt max 2,0 l/ha | 2 | Første sprøjtning lige efter plantning på småt ukrudt Anden sprøjtning 10-14 dage senere | Må ikke anvendes i høstarene |

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Midlerne skal anvendes til bekæmpelse af frøukrudt på ukrudtets kimbladstadie

Risiko for skade i gulerod, persillerod og pastinak

Der foreligger kun få forsøg med metamitron i gulerod, pastinak og persillerod. Overordnet er erfaringen dog, at der er en betydelig risiko for afgrødeskader, og der skal udvises særlig forsigtighed på let jord og i perioder med kølige og ustadige vejrforhold.

Det anbefales derfor altid, at afprøve midlerne (metamitron) på et mindre areal med forskellige doseringer, så der kan fås erfaringer med midlerne inden de anvendes i storskala.

Når metamitron anvendes som jordmiddel før fremspiring skal man være meget varsom med efterfølgende ukrudtsbekæmpelse med f.eks. Fenix. Som bladmiddel kan metamitron medføre alvorlige svidninger, og det anbefales ikke at behandle afgrøder på kimbladsstadiet. Desuden skal der udvises stor forsigtighed med doseringen. I forsøg er der registreret svidninger ved doseringer omkring 0,5 l/ha, og især i blanding med Fenix. Generelt tilrådes stor forsigtighed ved blanding med andre midler både før og efter fremspiring.