

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) til insektbekæmpelse i salat i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HorticAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Movento SC 100 (18-549) til insektbekæmpelse i salat i åbne væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus og salatrodslus i hovedsalat, pluksalat og andre salat-planter inkl. Brassicacea i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Må i hovedsalat, pluksalat og andre salat-planter inkl. Brassicacea ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved anvendelse i salat dyrket i jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår

Advarsel:

”Se Movento SC 100 etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Til bekæmpelse af bladlus og salatrodslus i åbne væksthuse

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Sprøjtefrist
Hovedsalat, pluksalat og andre salat-planter inkl. Brassicacea dyrket i jorden.	Bladlus	0,45 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,045 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,45 L Movento SC 100 pr. ha) *	Max 2 (min. 14 dages interval)	Max 2 kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet spiro-tetramat.	7 dage
	Salatrodslus	0,75 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L 0,075 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,75 L Movento SC 100 pr. ha) *			

* 0,045 % opløsning (= 45 ml Movento SC 100 opløst i 100 l vand)

** 0,075 % opløsning (= 75 ml Movento SC 100 opløst i 100 l vand)

Sprøjteudstyr: Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse.

Sprøjtetidspunkt:

Ved behov fra afgrødens 2-bladstadiet

Risiko for skade:

Ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves Movento SC 100 på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet, og risikoen for skader reduceres.

21. december 2020