

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) mod spindemider i tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar og vandmelon i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Nissorun 250 SC (561-6) mod spindemider i tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar og vandmelon i åbne væksthuse

Midemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar og vandmelon i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning
- For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Max 2 behandlinger med hexythiazox pr. areal pr. år.

Advarsel:

”Se Nissorun 240 SC etiketten”.

Brugsanvisning

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Sprøjtefrist
Tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk og courgette dyrket i jorden , uden recirkulering, eller i vækstmedie-blokke , som står på jorden.	0,3 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 L 0,02 % opløsning pr. 1000 m ² *	Max 2 (min. 7 dages interval)	1 (Alternativt kan 2 hold hver behandles 1 gang)	3 dage
Melon, græskar og vandmelon dyrket i jorden , uden recirkulering, eller i vækstmedie-blokke , som står på jorden.		Max 1	1	3 dage

*0,02 % opløsning (= 20 ml Nissorun 250 SC i 100 L vand)

Sprøjteteknik:

Sprøjte med horisontal eller vertikal sprøjtebom eller kærresprøjte med lanse.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen.

Forebyggelse af resistens:

Hvis Nissorun 250 SC anvendes mere end én gang anbefales det, hvis det er muligt, at midlet indgår i en strategi med midler, der har en anden virkemekanisme.

Risiko for skade:

Da der er begrænset erfaring med Nissorun 250 SC, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.