

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pirimor G (1-168) og LFS Pirimicarb (318-81) i sukkermajs

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GASA Nord Grønt kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for Pirimor G og LFS Pirimicarb i sukkermajs**

### *Insektmiddel:*

- Må kun anvendes i sukkermajs til behandling af bladlus
- Maksimalt 1 behandling pr. sæson
- Ikke senere end 7 dage før høst
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### *Advarsel:*

"Se Pirimor G og LFS Pirimicarb etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for Pirimor G og LFS Pirimicarb i sukkermajs**

*Skadegører:* Bladlus

*Dosering:* 280 g/ha

*Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:*

Der sprøjtes ved begyndende angreb.

Tidligst ved BBCH 51 (hanblomsterstand er mærkbar), og senest 7 dage før høst. Anvend tilstrækkelig vandmængde til at opnå god dækning af de dele af planten, hvor der er angreb af bladlus.

Den bedste virkning opnås ved temperatur på mindst 15 °C på sprøjtetidspunktet, stigende temperatur og stille vejr de følgende 2-3 timer efter sprøjtningen

*Antal behandlinger:* Maksimalt 1 behandling pr. sæson

31. oktober 2016