

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78) mod bladlus i suktermajs

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Pirimor 500 WG mod bladlus i sukkermajs

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod bladlus i sukkermajs
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Maksimalt 1 behandling pr. sæson
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Pirimor 500 WG etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Pirimor 500 WG i sukkermajs

Skadegører: Bladlus

Dosering: 280 g/ha

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Der sprøjtes ved begyndende angreb.

Tidligst ved BBCH 51 (hanblomsterstand er mærkbar), og senest 7 dage før høst. Anvend tilstrækkelig vandmængde til at opnå god dækning af de dele af planten, hvor der er angreb af bladlus.

Den bedste virkning opnås ved temperatur på mindst 15 °C på sprøjtetidspunktet, stigende temperatur og stille vejr de følgende 2-3 timer efter sprøjtningen

Antal behandlinger: Maksimalt 1 behandling pr. sæson

17. juni 2020