

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Proplant (361-1) mod Phytophthora og Pythium i prydplanter, planteskolekulturer og blomsterløg i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Proplant (361-1) mod Phytophthora og Pythium i pryddplanter, planteskolekulturer og blomsterløg i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod Phytophthora og Pythium i pryddplanter, planteskolekulturer og blomsterløg i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved dypning af blomsterløg
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker og åndedrætsværn ved udvanding
- Ved håndtering af behandlet jord, blomsterløg eller planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj
- Må kun anvendes på tætte borde med recirkulation eller på tæt bund med opsamling/recirkulation
- For at beskytte grundvand må behandlede planter kun udflyttes til containerplads med recirkulation
- For at beskytte bier må behandlede planter først udflyttes efter afblomstring

Advarsel:

”Se Proplant etiketten”

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod Phytophthora og Pythium

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
<u>Før såning eller plantning:</u> Maskinel opblanding i vækstmedie til brug i frøplanter og prikplanter dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation	Max 0,3 L i 10 L vand pr. m ³ . Der suppleres/ tilføres tilstrækkeligt vand til at gøre vækstmediet fugtigt	Max 1	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation <i>eller</i> bunden er tæt med opsamling/recirkulation	Ingen udflytning.
Udvanding (brusevanding) i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation	4,5-9 mL/m ² <u>Svarende til:</u> 3-6 L 0,15 % opløsning/m ² *, der udbringes på fugtigt vækstmedie. Brus behandlede planter over med rent vand.	Max 2 (min. 7 dage)		<u>Med recirkulation:</u> Behandlede planter må først udflyttes efter afblomstring.
				<u>Uden recirkulation:</u> Ingen udflytning.
<u>Før plantning i potter:</u> Dypning af blomsterløg. Dypvanding skal foregå på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation	Dypning i 20-30 min. i en 0,3 % opløsning**	Max 1		Ingen udflytning.

*0,15 % opløsning (= 15 mL Proplant i 10 L vand); **0,3 % opløsning (=30 mL Proplant opløst i 10 L vand)

Sprøjteteknik: Opblanding, udvanding (brusevanding) og dypning.

Virkemåde: Proplant er et systemisk svampemiddel, der anvendes ved opblanding i vækstmedie, til udvanding og til dypning af blomsterløg før plantning.

Tolerance: Proplant er generelt et skånsomt middel, men det anbefales at udføre en prøvebehandling inden det anvendes i nye arter/sorter.

Dato: 22. marts 2022