

**Brugsanvisning til mindre anvendelse af Turex
WG (738-1) og Turex WP (738-2)
i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og
lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på
friland eller i tunneller på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Turex WG (738-1) og Turex WP (738-2) i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod sommerfuglelarver i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes

Advarsel:

”Se Turex WG og Turex WP etiketten”.

Brugsanvisning

Kultur	Skadegører	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Jordbær i åbne og lukkede væksthuse samt på table top på friland eller i tunneller på friland	Larver af sommerfugle, bl.a. jordbærvikler	1 kg/ha	Max 3	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Salat og spinat i åbne og lukkede væksthuse	Larver af sommerfugle, bl.a. kålmøl, hvidsværmere og ugler			
Krydderurter i åbne og lukkede væksthuse	Larver af sommerfugle, bl.a. kålmøl			

Vandmængde: Der anvendes fra 400 og op til 2.000 L vand/ha. Sprøjteknik og vandmængde vælges for hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele. Typisk anvendes 500-2.000 L vand i væksthuse.

Risiko for skade: Der er ikke rapporteret skade af produktet i de nævnte kulturer, men da dokumentationen ikke nødvendigvis er fyldestgørende, kan det ikke garanteres, at der ikke kan opstå skade.