

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Naturalis (699-2) mod insekter og spindemider i prydplanter og planteskolekulturer, bladgrønt og bær i åbne og lukkede væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. CBC kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Naturalis (699-2) mod insekter og spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer, bladgrønt og bær i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter og spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer, bladgrønt og bær jf. brugsanvisningen i åbne og lukkede væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes

Advarsel:

”Se Naturalis etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i åbne og lukkede væksthuse

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger pr kultur (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Pryddplanter Planteskolekulturer	Spindemider Mellus Trips	0,75-1,5 l/ha	600-1500 l/ha	3 (min. 5 dage)	BBCH 11-89
Pryddplanter Planteskolekulturer	Spindemider Mellus Trips	Dypning af stiklinge: 0,2 l/100 l vand		1	BBCH 11-49
Krydderurter Salat Spinat Kål Rucola	Spindemider Mellus Trips Bladlus Sørgemyg Vandfluer	0,75-1,5 l/ha	600-1500 l/ha	3 (min. 5 dage)	BBCH 11-89
Krydderurter Salat Spinat Kål Rucola	Spindemider Mellus Trips Bladlus Sørgemyg Vandfluer	Dypning af stiklinge: 0,2 l/100 l vand		1	BBCH 11-49
Hindbær Brombær	Mellus Pletvingefrugtfluen (<i>D. suzukii</i>)	0,75-1 l/ha	600-1500 l/ha	3 (min. 5 dage)	BBCH 11-89
Jordbær	Pletvingefrugtfluen (<i>D. suzukii</i>)	0,75-1 l/ha	600-1500 l/ha	3 (min. 5 dage)	BBCH 11-89

Sprøjteteknik/udstyr: Sprøjteteknik og vandmængde vælges for hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele.

Omrøring skal være tilkoblet under udsprøjtning og blandingen skal bruges samme dag.

Dypning af stiklinge: Dyppes min. 5 sek. i opløsningen.

Risiko for skade: Ved anvendelse af Naturalis i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

Dato: 15. juli 2025