

Basisstoffer godkendt i EU

Basisstoffer godkendt pr. 1. november 2025

Stof	Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Antal behandlinger og behandlingsfrist	Tidspunkt	Kommentarer			
Agerpadderok 	Frugttræer	Bladsvampe	200 ml ekstrakt/100 L vand. 500-1000 L vand/ha	2-6 gange med 7 dages interval – ingen sprøjtefrist	Fra udspring til afsluttet blomstring	Hjemmelavet ekstrakt (se appendix I) med 2 g aktivstof/L i frugttræer og vin og med 2,25 g aktivstof/L i jordbær, hindbær og kartofler. Skal udbringes indenfor 24 timer.			
	Vin	Meldug, vinskimmel	200 ml ekstrakt/100 L vand. 100-300 L vand/ha		Fra udspring til beg. blomstring				
	Jordbær og hindbær (F og V)	Gråskimmel, ægte meldug, rødmarv, jordbær-sortråd/jordbærsortplet	225 ml ekstrakt/100 L vand. 300 L vand/ha	4-8 gange med 5-14 dages interval – ingen sprøjtefrist	BBCH 1-89				
	Kartofler (F og V)	Kartoffelskimmel, alternaria og ægte meldug	225 ml ekstrakt/100 L vand. 300 L vand/ha	4-8 gange med 5-14 dages interval – ingen sprøjtefrist	BBCH 10-90				
	Agurk (V)	Meldug, rodsygdomme	200 ml ekstrakt/100 L vand. 300 L vand/ha	2 gange med 3-4 dages interval. Sprøjtefrist 15 dage.	BBCH 19-49				
	Tomat (F)	<i>Alternaria solani</i> og <i>septoria lycopersici</i>	200 ml ekstrakt/100 L vand. 300 L vand/ha	2 gange med 14 dages interval. Sprøjtefrist 15 dage.	BBCH 51-59				
	Agurk (V og F)	Meldug, rodsygdomme	100 kg dækmateriale pr. ha. Dækmaterialet placeres rundt om de enkelte planter – ikke på hele arealet.	1 behandling		Dækmateriale: 90 g tørret overjordisk agerpadderok blandes med 1 liter organisk afdækningsmateriale.			
	Tomat (F)	<i>Alternaria solani</i> og <i>septoria lycopersici</i>							
	Prydplantetræer (tilhørende slægten Prunus) og roser (F og V)	Svampesygdomme; monilia, meldug, rosenstråleplet, rosenrust							
Brintoverilte Hydrogen peroxid. Ready to use produkt (< 5% hydrogen peroxide opløsning)	Væksthusgrønsager (V)	Jordbakterier; <i>Ralstonia solanacerum</i> , <i>Botrytis</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	Redskaberne dyppes/ vaskes i en hydrogenperoxid opløsning (15-30 ml/L)	Redskaberne desinficeres før brug	I forbindelse med beskæring	Ready to use produkt. (< 5% hydrogen peroxide opløsning)			
	Salat (lactuca sativa) (F+V)	Bladpletter forårsaget af bakterier <i>Xanthomonas campestris pv. vitians</i>	Frøene dyppes i en hydrogenperoxid opløsning i 5-15 minutter (10-15 ml/L)	1 behandling	Frøbehandling lige før såning				
	Haveblomster (F+V)	Svampe bl.a. <i>Alternaria zinnia</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Fusarium Spp</i>	Frøene dyppes i en hydrogenperoxid opløsning i 5-15 minutter (25-49 ml/L)	1 behandling	Frøbehandling før lige såning				
Chitosan-fødevarer 	Prydplanter og planteskolekulturer (F, V og I)	Induceret resistens mod svampe og bakterier	0,1-0,4 kg/ha	4-8 gange med 2 ugers interval. Ingen behandlingsfrist	BBCH 09 til BBCH 89	Renhed: 85 - 100 % chitosan Chitosan extract fra svampe (Aspergillus niger). I review report for Chitosan er beskrevet 2 måder at tilberede sprøjtevæsken på. Koncentration i sprøjtevæsken: 50-100 g/100 L vand			
	Græsser (alle arter) græsmarker, sportspladser og golfbaner		0,1-0,4 kg/ha		BBCH 09 til BBCH 89				
	Vindruer (F og V)		0,1-0,6 kg/ha		BBCH 10 til BBCH 79				
	Oliventræer (F og V)		0,1-0,4 kg/ha		BBCH 10 til BBCH 79				
	Frugt og bær (F og V)		0,1-0,8 kg/ha		BBCH 09 til BBCH 79				
	Grønsager (F og V)		0,1-0,4 kg/ha		Før såning Før lægning Før såning				
	Krydderurter (F og V)								
	Korn								
	Foderafgrøder								
	Korn		0,5-1,0 kg/1000 L vand	1 sprøjtning/dypning af såsæd, læggekartofler eller frø	Før såning Før lægning Før såning				
	Kartofler		0,5-2,0 kg/1000 L vand						
	Sukkerroer								
	Chitosan hydrochloride 		Frugt og bær (F og V)	Induceret resistens mod svampe og bakterier	0,1-0,8 kg/ha		4-8 gange med 2 ugers interval. Ingen behandlingsfrist	Fra udvikling af 1. blad/ud-spring til afsluttet blomstring	100 % chitosan hydro-chloride
			Grønsager (F og V)		0,1-0,4 kg/ha				
Krydderurter (F og V)									
Korn		0,5-1,0 kg/1000 L vand	1 sprøjtning/dypning af såsæd, læggekartofler eller frø		Før såning Før lægning Før såning				
Foderafgrøder									
Korn									
Kartofler		0,5-2,0 kg/1000 L vand	1 dypning/udvanding af løg		Spiringsfasen (BBCH 00-01)				
Sukkerroer		0,5-1,0 kg/1000 L vand							
Løg pryplanter (F og V)		0,1-0,8 kg/ha				Fra begyndende bladdannelse			
Rødbeder og sukkerroer		0,1-0,8 kg/ha	1-8 gange med 5-7 dages interval. Ingen behandlingsfrist		Fra begyndende bladdannelse				
Clayed charcoal granulat (blanding af trækul og bentonit)	Vin (F)	ESCA (Black Measles) Forårsages af et kompleks af svampe, der bl.a. om-fatter <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> , (<i>Togninia minima</i>), og <i>Phaeomoniella chlamydospora</i>	500 kg/ha. (indarbejdes i jorden)	1 behandling hvert 3. år					

Stof	Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Antal behandlinger og behandlingsfrist	Tidspunkt	Kommentarer
Diammonium phosphate	Kirsebær	Kirsebærfluen	1 fælde/træ dog max 100 fælder/ha. Max 1 L opløsning/fælde	6-8 ugers interval		Diammonium phosphate opløsning (40 g/L) placeres i fælder
Eddike.  - Ikke godkendt til ukrudtsbekæmpelse i økologisk produktion	Redskaber til beskæring af diverse planter (F)	Desinfektion mod bakterier og svampe	Redskaberne dyppes/ vaskes i en eddikeopløsning (se review report)	Redskaberne desinficeres før brug	I forbindelse med beskæring	Der skal anvendes eddike af fødevarekvalitet med max. 10 % eddike syre. Fremstilling af eddikeopløsninger fremgår af: Review report for the basic substance vinegar.
	Grønsager som gulerod, tomat og peberfrugt (F)	<i>Alternaria spp</i>	Frøene dyppes i en eddikeopløsning (se review report)	1 behandling	Frøbehandling lige før såning	
	Grønsager som gulerod, tomat, peberfrugt og kål (F og V)	<i>Clavibacter michiganensis</i> , <i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Xanthomonas</i> , <i>Vesicatoria</i> , <i>Botrytis aclada</i> , <i>Alternaria spp</i>		1 behandling		
	Hvede, durumhvede og spelt	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>	Såsæden behandles med en eddikeopløsning (se review report)	1 behandling	Såsædsbehandling lige før såning	
	Byg	<i>Pyrenophora graminea</i>	Såsæden behandles med en eddikeopløsning (se review report)	1 behandling	Såsædsbehandling lige før såning	
	Medicinal-, aromatiske- og parfumeafgrøder (V+F)	Ukrudt	Pr. ha udsprøjtes 10 liter ufortyndet eddike opløst i 100 liter vand	1 behandling, 120 dages sprøjtefrist	Anvendes før fremspiring af afgrøden. Ved for sen anvendelse kan afgrøden skades	
	Stier, fortove, rabatter, terrasser o.l.		Pr. ha udsprøjtes 6 liter ufortyndet eddike opløst i 100 liter vand	1-2 behandlinger med min. 7 dages interval	Efter fremkomst af ukrudt. Efter regn skal behandlingen udsættes min. 24 timer	
Esparsette (pelleteret) Onobrychis viciifolia	Vin (F)	Nematoder <i>Xiphinema index</i>	1000 g / m ²	1 behandling	BBCH 0, Efterår eller forår	Indarbejdes i jorden, på inficerede pletter
Fructose 	Æbler	Viklerlarver	10 gram/100 L vand	5-7 gange med 21 dages interval	Fra forår BBCH 65	Opløses i koldt vand lige før udsprøjtning. 10 g fructose pr. 100 liter vand. Udsprøjtes tidlig morgen før kl. 9.
	Fodermajs og suktermajs	Havesymfyl, <i>Scutigerella immaculata</i>	10 gram/100 L vand	Max. 2 behandlinger	1. behandling på 2-3 bladstadiet. 2. behandling på 4. blad-stadiet	
	Vin	Cikader, <i>Scaphoideus titanus</i>	10 gram/100 L vand	3 gange med min. 7 dages interval	BBCH 17-57	
	Vin	Vinskimmel, <i>Plasmopara viticola</i>	10 gram/100 L vand	Max. 12 gange med min. 7 dages interval	BBCH 10-57	
Komælk 	Vin (F)	Meldug, <i>Erysiphe necator</i>	10-120 liter komælk/ha i 100 - 300 L vand/ha	3-6 behandlinger med 6-8 dages interval	BBCH 07-57	
	Græskar (V)	Meldug	200 liter komælk/ha i 400 L vand/ha	3-4 behandlinger med 7-12 dages interval	BBCH 01-06	Ingen behandling når der er frugter
	Agurk og squash (V)	Meldug	50-150 liter komælk/ha i 1000- 1500 L vand/ha	3-4 behandlinger med 7 dages interval	BBCH 19-49	
	Sojabønne (F)	Meldug	180-270 liter komælk/ha i 1000-1500 L vand/ha	3-4 behandlinger med 7 dages interval	BBCH 19-49	
	Gerbera (V)	Meldug	80-160 liter komælk/ha i 500- 1000 L vand/ha	3-4 behandlinger med 7 dages interval	BBCH 51-69. 8 dages sprøjtefrist	
	Redskaber og arbejdshandsker. Alle afgrøder. (V)	Mod diverse virus	Dypning af redskaber og fingerspidser på handsker i 2 sekunder	Før/efter plantekontakt		Anvend mælk med min. 3,5 % protein. Skift mælken regelmæssigt.
Lecithin 	Frugttræer	Meldug, ferskenblæresyge	0,375-0,75 kg/ha (75 g/100 liter vand)	3-12 gange med 5 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.	BBCH 03-79	
	Stikkelsbær (F)	Meldug	1-2 kg/ha (200 g/100 liter vand)	2-4 gange med 5 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.	BBCH 10-85	
	Vin (F)	Meldug	0,075-0,225 kg/ha (75 g/100 liter vand)	3-12 gange med 5 dages interval. Sprøjtefrist 30 dage.	BBCH 11-85	
	Jordbær og hindbær (F og V)	Meldug, rødmarv	0,6-1 kg/ha (200 g/100 liter vand)	3-12 gange med 5 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH 10-89	
	Kartofler (F og V)	Kartoffelskimmel	0,2-0,8 kg/ha (200 g/100 liter vand)	3-12 gange med 5 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH 10-90	
	Gulerod	Meldug, <i>Leveillula taurica</i>	2 kg/ha (200 g/100 liter vand)	4 gange med 14 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH 19-90	
	Agurk (V og F)	Meldug	1,5-2,25 kg/ha (150 g/100 liter vand)	2-6 gange med 5 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.	BBCH 10-89	
	Hovedsalat (F og V)	Meldug		2 gange med 7 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.		
	Vårsalat (feldsalat) (F og V)	Meldug		1 gang Sprøjtefrist 5 dage.		
	Tomat (V og F)	Skimmel (<i>Phytophthora infestans</i>)		2-6 gange med 7 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.		
	Endivie (F og V)	Alternaria				
	Prydplanter (F og V); specielt roser	Meldug og andre svampesygdomme	0,075-0,225 kg/ha (75 g/100 liter vand)	3-12 gange med 5 dages interval. Sprøjtefrist 5 dage.		

Stof	Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Antal behandlinger og behandlingsfrist	Tidspunkt	Kommentarer
Læsket kalk, Calciumhydroxid 	Kernefrugt (F)	Frugttræskræft	Sprinkler: 25-50 kg/ha	2- 7 gange med 5-14 dages interval	Fra bladfald til ultimo december	Calciumhydroxid står på økologilisten
	Kernefrugt og stenfrugt (F)	Frugttræskræft og andre sygdomme	Sprøjtning: 15-25 kg/ha Pletbehandling ved påsmøring		1-2 gange	
	Løgekstrakt (<i>Allium cepa</i>) 	Kartofler (F)	Kartoffelbladplet (<i>Alternaria solani</i>)	6 - 10 liter ekstrakt/ha opløses i 600-1000 liter vand/ha	3 til 5 behandlinger med 7 dages interval	
Tomat (F+V)		Kartoffelskimmel (<i>Phytophthora infestans</i>)	15 liter ekstrakt/ha opløses i 1500 liter vand/ha	3 til 5 behandlinger med 3-4 dages interval	75 dage efter plantning, BBCH 21-75	
Agurk (F+V)		Gråskimmel (<i>Botrytis cinerea</i>)		3 til 5 behandlinger med 7 dages interval		
Løgolie  Kun hvis der bruges ren løgolie i dispenserne uden tilsætning (metode 1 under dosering) må det anvendes til økologi	Rodfrugter (F)	Repellerende/forvirrende effekt mod gulerodsfluen	4-8 dispensere pr. ha; hver dispenser fyldes med max: 1) 20 ml løgolie eller 2) 4,4 g løgolie + 25,6 g ethylen-vinyl acetat granulat (forholdet 1:5,8). Granulatet forbedrer fordampningen		Anvendes kort efter plantning eller fremspiring og til før høst (april-november)	Dispensere: Små glas eller plastic beholdere med åbninger der tillader fordampning. Løgolie må kun anvendes til professionel produktion. Ved håndtering af løgolie skal anvendes beskyttelsesbriller, overall, beskyttelseshandsker og ved risiko for inhalering maske samt øvrige anbefalinger i hht. sikkerhedsdatabladet.
Magnesium hydroxid	Vin (F)	Vinskimmel, meldug, vindruesort råd	0,437 - 3,5 kg/ha 100-800 l/ha	1 behandling Ingen sprøjtefrist	BBCH 09-85	
	Oliventræer (F)	<i>Spilocaea oleaginea</i>	0,7 - 2,33 kg/ha 300-1000 l/ha	1 behandling Ingen sprøjtefrist	BBCH 11-89	
	Banan (F)	<i>Mycosphaerella spp</i>	1,6 - 7,0 kg/ha 80-350 l/ha	12 gange med 30 dages interval. Ingen sprøjtefrist	BBCH 09-89	
	Korn; havre, rug, triticale, hvede	Septoria	1,6 - 7,0 kg/ha 80-350 l/ha	3 gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BCH 30-65	
	Tomat, aubergine, peberfrugt, chilli,	Kartoffelskimmel (<i>Phytophthora Infestans</i>)	0,56 - 0,93 kg/ha 600-1000 l/ha	3 gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH 14-85	
	Kartoffel (F)	Kartoffelskimmel (<i>Phytophthora Infestans</i>)	0,84 - 1,4 kg/ha 300-500 l/ha	10gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH 09-49	
	Roser (F)	Meldug	0,29 - 0,58 kg/ha 600-1200 l/ha	2 gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH <49	
	Prydplanter (F)	Meldug	0,29 - 0,58 kg/ha 600-1200 l/ha	2 gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH <49	
	Stenfrugt; fersken, aprikos, kirsebær, blomme, nekterin, mirabelle (F)	Meldug	0,29 - 0,58 kg/ha 600-1200 l/ha	2 gange med 4 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH <49	
	Ris (F)	<i>Magnaporthe grisea</i>	1,6 - 7,0 kg/ha 80-350 l/ha	3 gange med 7 dages interval. Ingen sprøjtefrist.	BBCH <49	
Natron, natriumbicarbonat 	Grøntsager (F og V)	Meldug	2-5 kg/ha. Max 1 % opløsning	Max 8 gange med 10 dages interval. Sprøjtefrist 1 dag.	BBCH 12-89	For at undgå skader anbefales det at afprøve forskellige koncentrationer af produktet på et mindre areal første gang det anvendes.
	Bær (F og V)	Meldug	2-5 kg/ha. Max 1 % opløsning		BBCH 12-89	
	Vin	Meldug	2,5-5 kg/ha. Max. 2 % opløsning		BBCH 12-89	
	Æble	Skurv	2,5-5 kg/ha. Max. 1 % opløsning		BBCH 10-85	
	Høstet frugt, æble, kirsebær	Penicillium lagersvampe	1-4 % opløsning	1-2 gange med 10 dages interval. Sprøjtefrist 1 dag.	Post harvest behandling ved dypning eller	
	Prydplanter (F og V)	Meldug	2-5 kg/ha. Max 1 % opløsning	Max 8 gange med 10 dages interval. Sprøjtefrist 1 dag.	BBCH 12-89	
	Potteplanter (V)	Lungemos (grønt løv og frugt legemer)	122 kg/ha	1 behandling	Post emergence ved direkte behandling med pulver	

Stof	Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Antal behandlinger og behandlingsfrist	Tidspunkt	Kommentarer
Nælde (<i>Urtica spp</i>)  Ekstrakt til udsprøjtning eller jorddækning (fremstilling og anvendelse se appendix I og appendix II i godkendelsesrapporten)	Frugttræer, hyld, valnød, ribs, bønner, kartofler, salat, kål, roser og spiræa (F)	Bladlus	Dosering af nælde ekstrakt fremgår af godkendelsesrapporten appendix II	1-5 behandlinger; Min. 7 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	Filtreret ekstrakt: 24 timers udblødning ved 20°C er nok. Skal anvendes kurativt
	Raps, kål og radise (F)	Jordlopper og kålmøl		1-6 behandlinger; Min. 7 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	
	Æble og pære (F)	Æblevikler		Max 3 behandlinger; Min. 15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	April - maj	
	Bønner og vin (F)	Spindemider		1-6 behandlinger; 7-21 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	Filtreret ekstrakt: 24 timers udblødning ved 20°C er nok
	Raps, kål, radise (F)	Alternaria sp.		1-6 behandlinger; 7-15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	
	Græskarfamilien (melon, græskar, courgette, squash m.fl.) (F)	Ægte meldug (<i>Erysiphepologoni</i>) og Alternaria		1-6 behandlinger; 7-15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Indtil BBCH 89	
	Frugttræer	Alternaria, Monilia, gråskimmel og <i>Rhizopus stolonifer</i>		1-6 behandlinger; 7-15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	
	Vin	Meldug (<i>plasmopara viticola</i>)		1-6 behandlinger; 7-15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	
	Kartofler	Kartoffelskimmel		1-6 behandlinger; 7-15 dages interval; 7 dages sprøjtefrist	Forår – sommer. BBCH-stadier: Se godkendelsesrapporten appendix II	
Pilebarkeekstrakt 	Frugttræer	Bladsvampe	222.22 ml ekstrakt/100 L vand (500-1000 L vand/ha)	2-6 gange med 7 dages interval	Fra udspring til blomstring	Hjemmelavet ekstrakt med 2,22 g aktivstof/L. Skal udbringes indenfor 24 timer
	Vin	Meldug, vinskimmel	222.22 ml ekstrakt/100 L vand (100-300 L vand/ha)			
Salt Natriumchlorid	Vin	Meldug (<i>Erysiphe necator</i>)	1,2-4,0 kg/ha per behandling Max 6 kg/ha per år	1-2 behandlinger 30 dages sprøjtefrist	Forår - sommer. BBCH 10 – BBCH 57	Vandopløseligt pulver, (>97 % NaCl)
		Vinskimmel (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,1-2,0 kg/ha per behandling Max 2 kg/ha per år	1-8 behandlinger 30 dages sprøjtefrist	Forår - sommer. BBCH 10 – BBCH 80	
		Vinvikler (<i>Lobesia botrana</i>)	1,2 kg/ha pr. behandling	30 dages sprøjtefrist	Behandling 1: BBCH 55-57. Behandling 2: BBCH 75-77. Behandling 3: BBCH 83-91	
	Svampe	<i>Cladobotryum</i> , <i>Lecanicillium</i> , <i>Mucogone pemiciosa</i>	Pletbehandling ved udstrøning af 0,03 g salt pr. kg substrat	1 behandling	Ved forekomst dog tidligst 16 dage inde i svampens vækstcyklus	Granulat (>97 % NaCl)
Sennepsfrømel  (<i>Brassica alba</i> , <i>Brassica juncea</i> og <i>Brassica nigra</i>)	Hvede, durum og spelt (F)	Frødesinfektion/bejdsning mod svampesygdomme som stinkbrand	1,5 kg sennep frø pulver + 4,5 liter vand/100 kg såsæd	Såsædsbehandling (bejdsning) før såning	Ved behov	Sennepsfrømelet skal være af fødevarekvalitet
Solsikke olie 	Tomat (F)	Ægte meldug (<i>Oidium neolycopersici</i>)	0,5 - 5,0 l/ha (92 % solsikkeolie) i 500-1000 l vand	2-4 gange med min. 8 dages interval. Sprøjtefrist 2 dage.	BBCH 32-37 og BBCH 61-71	Undgå behandling under blomstring. Undgå spild.

Stof	Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Antal behandlinger og behandlingsfrist	Tidspunkt	Kommentarer
Sucrose 	Æbler	Viklerlarver		7-10 gange med min. 15 dages interval	Forår-sommer (BBCH 06-89)	Opløses i koldt vand lige før udsprøjtning. 10 g sucrose pr. 100 liter vand. Udsprøjtes tidlig morgen før kl. 9.
	Suktermajs	Majshalvmøl	10 gram/100 L vand	3-4 gange med min. 15 dages interval	BBCH 12-89	
	Fodermajs				BBCH 12-51	
	Vin	Cikader, <i>Scaphoideus titanus</i>	10 gram/100 L vand. 150 L vand	3 gange med min. 7 dages interval	BBCH 17-57	
	Vin	Vinskimmel, <i>Plasmopara viticola</i>	10 gram/100 L vand. 100 - 200 L vand	Max. 12 gange med min. 7 dages interval	BBCH 10-57	
Talkum  (naturligt forekommende vandholdigt magnesium silikat) f.eks. Invelop med 85 % talkum (E 553b)	Frugttræer (F)	Fysisk virkemekanisme/barriere mod insekter og mider. Bl.a. pærebladløpper, suzukii-fluer og frugttræsspindemider	Første behandling: Max 21,25 kg aktivstof/ha (= max 25 kg Invelop/ha) Efterfølgende behandlinger: Max 17 kg aktivstof/ha (= max 20 kg Invelop/ha)	2-5 behandlinger 3-4 ugers interval	Fra BBCH 41. Udsprøjtes morgen eller sen aften på tørre planter. Anbefales udsprøjtet uden for biernes flyvetid specielt i blomstrende afgrøder/kulturer.	Renhedskrav til talkum produkt: Se appendix I i review report. Sprøjteopløsning tilberedes lige før brug og holdes omrørt.
	Frugttræer (F)	Fysisk virkemekanisme/barriere mod svampe bl.a. meldug	Max 12,75 kg aktivstof/ha (= max 15 kg Invelop/ha)	3-5 behandlinger 2-3 ugers interval		
	Vin (F)			2-5 behandlinger 3-4 ugers interval	Fra BBCH 20. Udsprøjtes morgen eller sen aften på tørre planter. Anbefales udsprøjtet uden for biernes flyvetid specielt i blomstrende afgrøder/kulturer.	
Valle 	Agurk og squash (V)	Meldug	6-30 L valle/ha i 1000-1500 liter vand/ha	3-5 gange med 7 dages interval	BBCH 19-49.	Valle skal anvendes med det samme og ikke opbevares i metalbeholdere. Udskift valleopløsningen regelmæssigt for at undgå smitte. For at sikre effektivitet anvendes valle protein pudder med min. 80 % indhold.
	Tomat	Begomovirus	6-30 L valle/ha i 1000-1500 liter vand/ha	3-5 gange med 3-4 dages interval	BBCH 10-49.	
	Vin	Meldug	6-30 L valle/ha i 100-300 liter vand/ha	3-5 gange med 7-10 dages interval	BBCH 10-49.	
	Redskaber og arbejdshandsker. Alle afgrøder.	Mod virus	Dypning af redskaber og fingerspidser på handsker. Handsker dyppes i 5 sek. og redskaber i 5 min.	Før/efter plantekontakt		
Vindruekerne ekstrakt	Vin	Vinskimmel	98 g/100 L vand. 300 L vand/ha	6 gange med 5-7 dages interval. Ingen sprøjtefrist	BBCH 13-57 og BBCH 71-79	
	Æble	Skurv	98 g/100 L vand. 500 L vand/ha		BBCH 11-59	
	Kartoffel	Kartoffelskimmel Phytophthora infestans	98 g/100 L vand. 300 L vand/ha		BBCH 31-59 og BBCH 70-90	
	Salat (F og V)	Salatskimmel, bladskimmel	98 g/100 L vand. 500 L vand/ha		BBCH 19-50	
				3 gange med 5-7 dages interval. Ingen sprøjtefrist		
Øl 	Alle spiselige og ikke spiselige afgrøder (F)	Snegle	Max 1 fælde pr. m ²	1-5 behandlinger	Ved behov	Der skal anvendes tildækkede sneglefælder

 = godkendt til økologi. F = friland. V = væksthus. I = indendørs.

Oversigten findes også på HortiAdvice hjemmeside (www.hortiadvice.dk) under Plantebeskyttelse sammen med godkendelsesrapporterne (review reports), hvor der er en mere detaljeret brugsanvisning samt opskrifter på fremstilling af ekstrakter, dækmaterialer og opløsninger. På hjemmesiden under Plantebeskyttelse kan også findes BBCH skalaerne for de forskellige afgrøder og kulturer.

Basisstof er et aktivstof, der kan godkendes som basisstof, hvis det er godkendt til brug i anden sammenhæng end plantebeskyttelse i EU, samtidig med at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet. Et godkendt basisstof må ikke markedsføres som et sprøjtemiddel eller omformuleres til dette formål og har således heller ikke databeskyttelse, men må bruges i hele EU som sprøjtemiddel uden yderligere godkendelse eller tidsbegrænsning. Basisstoffer må kun anvendes i overensstemmelse med godkendelsen. Det er derudover vigtigt at bemærke, at eftersom basisstoffer ikke markedsføres som sprøjtemidler, er der ikke produktansvar knyttet til denne brug. Det er derfor brugerens eget ansvar, hvis der fx kommer skader på afgrøden som følge af behandlingen med et basisstof. Det anbefales derfor, at basisstoffet afprøves på få planter, før hele afgrøden behandles.

På denne oversigt er undladt enkelte anvendelser for nogle basisstoffer ekeempelvís post-harvest af bananer, avacado ol. Basisstoffet L-cysteine er undladt, da det kun har godkendelser i tropiske arealer.