

**Brugsanvisning til mindre anvendelse af Armicarb (1008-3)  
til svampebekæmpelse i æbler, pærer, stenfrugt, solbær, ribs,  
stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hindbær, brombær, vindruer,  
jordbær, jordbær i tabletop på friland eller i tunnel på friland, løg,  
skalotteløg, hvidløg, porrer, bundtløg, forårsløg, gulerod, persillerod,  
pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskok, skorzonerrod, peberrod,  
kålroe, majroe, hoved-, blomster og bladkål, rosenkål, asparges, agurk,  
squash, tomat, aubergine, peberfrugt, asieagurk, græskar, salat,  
bladbeder, babyleaf, bælgfrugter, krydderurter, roser, prydbuske,  
prydplanter, blomster, bladselleri, knoldfennikel, kardon og artiskok på  
friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

**Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

*Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Agronaturalis Ltd. kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Armicarb (1008-3) mod sodplet i æbler på friland, samt svampebekæmpelse på friland jf. brugsanvisningen

### Svampemiddel:

- Må kun anvendes til svampebekæmpelse i æbler, pærer, stenfrugt, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hindbær, brombær, vindruer, jordbær, jordbær i tabletop på friland eller i tunnel på friland, løg, skalotteløg, hvidløg, porrer, bundtløg, forårsløg, gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskok, skorzonnerod, peberrod, kålroe, majroe, hoved-, blomster- og bladkål, rosenkål, asparges, agurk, squash, tomat, aubergine, peberfrugt, asiagurk, græskar, salat, bladbeder, babyleaf, bælgfrugter, krydderurter, roser, prydbuske, prydplanter, blomster, bladselleri, knoldfennikel, kardon og artiskok på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i spiselige afgrøder ikke anvendes senere end 1 dag før høst
- I æbler, vindruer, bærbuske og prydplanter, der er mere end 60 cm høje:  
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående
- Må i æbler, vindruer, bærbuske og prydplanter højere end 50 cm ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPE3)

### Advarsel:

”Se Armicarb etiketten”

## Brugsanvisning

### Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde L/ha	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist / PHI
Æble	Sodplet, meldug	5 kg/ha	400-1500	Max 8* (min. 7 dage)	BBCH 72-89	1 dag
Pære	Skurv, meldug, sodskimmel	5 kg/ha	400-1500	Max 4-8* (min. 7 dage)	BBCH 07-89	1 dag
Stenfrugt	Monilia	5 kg/ha	400-1500	Max 8* (min. 7 dage)	BBCH 60-81	1 dag
Solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hindbær og brombær	Meldug	5 kg/ha	500-1500	Max 8 (min. 7 dage)	BBCH 11-91	1 dag
Vindruer	Meldug, gråskimmel	2 kg/ha	200-400	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 60-85	1 dag
		4 kg/ha	400-800		BBCH 61-70	
		5 kg/ha			BBCH 71-74	
Bladbeder	Salatskimmel, meldug	3 kg/ha	600-1000	Max 8 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Jordbær inkl. jordbær dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland	Meldug	3 kg/ha	600-1000	Max 8 (min. 7 dage)	BBCH 10-93	1 dag

Løg, skalotteløg, hvidløg, porrer, bundtløg og forårsløg	Løgringplet, bladplet, løgskimmel	3 kg/ha	400-600	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Asparges	<i>Stemphylium</i> ringplet	3 kg/ha	800-1000	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 39-93	1 dag
Gulerod, kålroe, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskok, skorzonerrod, peberrod og majroe	Meldug	3 kg/ha	200-800	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Hoved-, blomster- og bladkål, rosenkål	Meldug	3 kg/ha	400-600	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Agurk, squash, tomat, aubergine, peberfrugt, asieagurk og græskar	Meldug	<50 cm: 1,5 kg/ha	<50 cm: 600	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 12-89	1 dag
		50-125 cm: 2,25 kg/ha	50-125 cm: 900			
		>125 cm: 3 kg/ha	>125 cm: 1000			
Salat	Salatskimmel, meldug	3 kg/ha	600-1000	Max 8 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Krydderurter	Meldug	3 kg/ha	400-600	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 12-89	1 dag
Babyleaf	Meldug, bladskimmel (kål-, salat-, ærte- og spinatskimmel)	3 kg/ha	400-600	Max 4 (min. 7 dage)	BBCH 12-18	1 dag
Bælgfrugter	Meldug	<50 cm: 1,5 kg/ha	<50 cm: 600	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 13-81	1 dag
		50-125 cm: 2,25 kg/ha	50-125 cm: 900			
		>125 cm: 3 kg/ha	>125 cm: 1000			
Bladselleri, knoldfennikel, kardon og artiskok	Meldug	3 kg/ha	600-1000	Max 6 (min. 7 dage)	BBCH 13-49	1 dag
Roser og prydbuske	Meldug	5 kg/ha	400-1000	Max 8 (min. 7 dage)	BBCH 13-91	Ikke relevant
Prydplanter og blomster		3 kg/ha				

\*) Max 8 udbringninger pr. år i alt, også hvis den mindre anvendelse sker i kombination med bekæmpelse af andre skadevoldere af afgrøden. Af hensyn til risiko for afgrødeskade i pærer bør antal behandlinger i pærer enten begrænses til 4 eller ved flere behandlinger bør disse ske skiftevis med andre midler.

**Sprøjteteknik/udstyr:** Marksprøjte med sprøjtebom. Håndholdt- eller rygsprøjte.  
Et antiskummemiddel skal tilføjes tanken for at undgå overdreven skumdannelse.

Dato: 23. april 2025

Opdateret 24. april 2026