

Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i hindbær, brombær, blåbær, kirsebær og blomme på friland og i jordbær på friland eller i tunneller.

Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 1. juni 2026 til den 28. september 2026.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i ovennævnte afgrøder mod pletvingefrugtfluen (*Drosophila suzukii*). Conserve indeholder aktivstoffet spinosad.

Advarselstekst:

Nedenstående brugsanvisnings doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ved udbringning i jordbær, blåbær, hindbær og brombær på friland.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning i blommer og kirsebær på friland.

Brugere skal anvende kemiske bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og sidde i lukket førerkabine med kulfilter og anvende beskyttelsesdragt ved udbringning i blommer og kirsebær på friland.

Bruger skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og beskyttelsesdragt ved udbringning i jordbær, blåbær, hindbær og brombær på friland.

Ved håndtering af behandlede jordbær, brombær, hindbær og blåbær på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.

Ved håndtering af behandlede kirsebær og blommer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker og der må maksimalt arbejdes med behandlede kirsebær og blommer i 6,5 timer/dag pr. plukker.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ved udbringning af jordbær i tunneller.

Brugere skal ved håndholdt sprøjtning anvende kemiske bestandige handsker, beskyttelsesdragt og ansigtsvisir ved blanding og påfyldning og anvende vandtæt beskyttelsesdragt og kemisk bestandige handsker ved håndholdt udbringning af jordbær i tunneller.

Brugere skal ved håndholdt rygsprøjte anvende kemiske bestandige handsker, beskyttelsesdragt og ånde-rætsværn (FP1, P1 el. lign.) ved blanding og påfyldning og anvende vandtæt beskyttelsesdragt og kemisk bestandige handsker ved håndholdt udbringning i jordbær i tunneller.

Ved håndtering af behandlede jordbær i tunneller skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker og der må maksimalt arbejdes med behandlede jordbær i 7 timer/dag pr. plukker.

Må ikke anvendes nærmere end hhv. 15, 30 og 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for hhv. jordbær, buskbær og frugttræer.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Må i jordbær, hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra blomstrende afgrøder og i kirsebær og blomme ikke nærmere end 50 meter fra blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter for jordbær og buskbær og 40 m for frugttræer fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Brugsanvisning

Kultur	Skadegørere	Max dosering pr. behandling	Max antal behandlinger	Behandlingsinterval	Max antal plukketimer pr. dag pr. plukker	Sprøjtefrist	behandlings-tidspunkt	Vækststadier (BBCH)
Jordbær på friland eller i tunneller	Pletvingefrugtfluen	0,45 L/ha	3	Min 7 dage	7	1 dag	Juni-oktober	71-87
Hindbær og brombær	Pletvingefrugtfluen	0,6 L/ha	2	Min 10 dage	7.5	3 dage	Juli-oktober	75-89
Blåbær	Pletvingefrugtfluen	0,6 L/ha	2	Min 7 dage	7.5	3 dage	Juli-oktober	75-89
Kirsebær og blomme	Pletvingefrugtfluen	0,95 L/ha	1		6,5	7 dage	Juli-september	75-87

Udsprøjtning

Conserve er et kontaktmiddel. Effekten sker når insekterne/larverne kommer i berøring med midlet eller via fødeoptagelse. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjte teknik, hvor der opnås en god dækning af planterne.

Udbringning kun med traktormonteret sprøjte på friland.

Bemærkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Farlig for bier

Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket for Conserve (64-51), læs denne grundigt før brug.

Conserve (64-51) må anvendes i økologisk produktion.

GODKENDT

af Miljøstyrelsen:

9. marts 2026

Gældende fra 1. juni 2026

For pakninger på:

1 L

